

## إجابات تدريبات الدرس

### معكوس المشتقة

#### تدريب ١

بين أن الاقتران م (س) = س<sup>٤</sup> - جاس -  $\frac{1}{3}$  ، هو معكوس لمشتقة الاقتران

$$ق(س) = س^٤ - ٣جاس$$

الحل



ق(س) اقتران متصل

$$م(س) = س^٤ - ٣جاس = ق(س)$$

∴ م (س) معكوس لمشتقة الاقتران ق(س)

#### تدريب ٢

إذا كان الاقترانان م(س) ، ه(س) معكوسين لمشتقة الاقتران المتصل ق(س) ، وكان ل(س) = ٣م(س) - ٥ه(س) ، فجد ل(س) بدلالة ق(س).

الحل

$$ل(س) = ٣م(س) - ٥ه(س)$$



$$ل(س) = ٣م(س) - ٥ه(س)$$

$$= ٣ق(س) - ٥ق(س)$$

$$= -٢ق(س)$$

### تدريب ٣

إذا كان  $q$  اقتراناً متصلًا على مجاله، وكان  $\left[ q(s) \text{ جا } \frac{\pi^3}{2} = s + 1 \right]$  فجد  $q'(s)$ ، فجد  $q'(s)$

الحل



$$\text{جا } \frac{\pi^3}{2} = s + 1$$

$$\left[ q(s) \text{ جا } \frac{\pi^3}{2} = s + 1 \right]$$

$$\left[ -q'(s) \text{ جا } \frac{\pi^3}{2} = 1 \right]$$

اشتقاق الطرفين



$$-q'(s) \text{ جا } \frac{\pi^3}{2} = 1$$

$$q'(s) = -\frac{1}{\text{جا } \frac{\pi^3}{2}}$$

### تدريب ٤

إذا كان  $\left[ q(s) \text{ جا } s = 2s - \text{جتا } s + 1 \right]$ ، فجد  $q'(s)$ ، فجد قيمة الثابت  $A$ .

الحل



اشتقاق الطرفين

$$q'(s) \text{ جا } s = 2 - \text{جتا } s + A$$

$$q'(s) \text{ جا } s = 2 - \text{جتا } s + A$$

$$\text{صفر} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times A + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times 2$$

$$\text{صفر} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times A + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times 2$$

$$\text{صفر} = \frac{A}{\sqrt{2}} + 1$$



$$\frac{A}{\sqrt{2}} = -1 \therefore A = -\sqrt{2}$$